

ДИНЕФРИН
Инструкция
по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название препарата: Динефрин.

МНН: Комбинированный препарат.

Лекарственная форма: Раствор для приема внутрь.

Состав: 100 мл раствора содержат:

Хвоща полевого.....	600 мг;
Торичника красного.....	370 мг;
Пеумус (лист болдо)	300 мг;
Опунции индийской.....	170 мг;
Железницы	170 мг;
Розмарина лекарственного.....	170 мг;
Пырея ползучего.....	170 мг;
Мелиссы лекарственной	170 мг;

Вспомогательные вещества: вода, калия сорбат.

Фармако-терапевтическая группа: Другие препараты, для лечения урологических заболеваний.

Код АТХ: G04BX50

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Динефрин комбинированный препарат растительного происхождения, обладающий диуретическим, спазмолитическим, литолитическим, противовоспалительным, антибактериальным, желчегонным и антиоксидантным эффектами. Динефрин усиливает элиминацию из организма солей мочевой кислоты, токсинов, солей тяжелых металлов, что препятствует выпадению в мочевых путях кристаллов, росту имеющихся камней и формированию новых; подщелачивает мочу и поддерживает её pH в пределах 6,2-6,8, что также препятствует образованию камней. При инфекции мочевыводящих путей препарат повышает эффективность лечения антибиотиками, нормализует мочеиспускание, способствует уменьшению болей, снижает риск повторных обострений. Препарат обладает хорошей переносимостью и возможностью длительного применения в сочетании с антибактериальными препаратами.

Фармакокинетика:

Препарат комбинированный, поэтому проведение кинетических исследований не представляется возможным.

Показания для применения:

- избыточное образование солей в почках (уратов, оксалатов, фосфатов, карбонатов);
- мелкий уролитиаз;
- профилактика рецидива камнеобразования после удаления камней;
- подагра;
- инфекции мочевыводящих путей: цистит, уретрит, пиелонефрит;
- дизурические явления;
- спазм моче- и желчевыводящих путей;
- спастический колит;
- различные виды интоксикаций (лекарственные, алкогольные, наркотические, пищевые отравления).

Способ применения и дозировка:

Препарат применяется внутрь, 3 раза в день за 30 минут до еды.

Детям дошкольного возраста по 5-10 мл 3 раза в день.

Детям школьного возраста по 15 мл 3 раза в день.

Взрослым по 45 мл 3 раза в день.

Продолжительность приема препарата в течение 2-4 недель.

Дозировка может корректироваться врачом.

Побочное действие:

Побочные действия при назначении рекомендуемых доз не наблюдались.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата;
- детский возраст до 2 лет;
- серьезные нарушения функции почек и печени.

Беременность и грудное вскармливание:

Применение препарата во время беременности и лактации возможно только по назначению врача. В этот период при помощи лекарственного средства чаще всего устраняются проблемы в виде большого числа скопившихся солей из-за нарушения в питании и сбоя в работе почек. Динезин не оказывает токсического воздействия на плод. Пока не было зарегистрировано ни одной проблемы с беременностью из-за употребления лекарственного препарата. Желательно начинать прием медикамента только со второго триместра.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими препаратами не выявлено.

Форма выпуска:

Раствор для приема внутрь по 600 мл в картонной упаковке вместе с листком-вкладышем.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить препарат в недоступном для детей месте.

Не использовать препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта врача.

Произведено для:

MAXX-PHARM. LTD

Лондон, Великобритания

