

МИКОЖИНАКС
Инструкция
по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Микожинакс.

МНН: Неомидин + Нистатин + Полимиксин В.

Лекарственная форма: Вагинальные таблетки.

Фармако-терапевтическая группа: Комбинированный препарат (антибиотики: аминогликозид + полиен + циклический полипептид). Другие антибиотики в комбинациях.

Состав: Каждая вагинальная таблетка содержит:

Неомицина сульфат35000 МЕ;

Полимиксина В сульфат35000 МЕ;

Нистатин100000 МЕ.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами. Оказывает антибактериальное, бактерицидное и противогрибковое действие.

Неомицин и полимиксин В активны в отношении многих грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. *Streptococcus spp.* и анаэробные бактерии нечувствительны к этим антибиотикам. Нистатин оказывает фунгицидное действие в отношении грибов рода *Candida*. Улучшает трофические процессы в слизистой влагалища.

Фармакокинетика:

Равномерно распределяется по слизистой влагалища, оказывая местное бактерицидное и фунгицидное действие. Практически не всасывается с поверхности слизистой влагалища.

Показания к применению:

- Лечение неспецифических, грибковых, смешанных вагинитов, вульвовагинитов и цервикалитов;
- Предоперационная профилактика инфекционных осложнений при гинекологических вмешательствах;
- До и после диатермокоагуляции шейки матки;
- Перед внутриматочными диагностическими процедурами;
- Перед родами.

Взаимодействие с лекарственными средствами:

Не рекомендуется использовать в сочетании со спермицидами, т.к. возможно снижение активности препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяется интравагинально. Таблетку перед введением во влагалище можно смочить в воде. Лежа на спине, вводят глубоко во влагалище вечером перед сном. Курс лечения — 12 дней. Профилактический курс — 6 дней. В случае пропуска в применении одной или нескольких таблеток, применение препарата следует возобновить в обычном режиме дозирования.

Особые указания:

Перед применением препарата необходимо предварительное взятие мазка и проведение бактериологического анализа.

Сроки применения препарата должны быть ограничены с целью предупреждения формирования устойчивости к нему отдельных возбудителей заболеваний и риска реинфекции.

Во время лечения не рекомендуется использовать колпачки и презервативы из латекса.

Не следует прерывать курс лечения во время менструации.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к любому компоненту препарата;
- 1-й триместр беременности;

- период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью: Применение в период беременности (во II и III триместрах) возможно только по назначению врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода;

Период лактации является противопоказанием, при необходимости использования препарата в данный период кормление грудью прекращают.

Форма выпуска:

Таблетки вагинальные № 12.

Условия хранения препарата:

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Произведено для:
MAXX-PHARM LTD.
Лондон, Великобритания

