

НОРМА КИДС
Инструкция
по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название препарата: Норма Кидс.

Действующее вещество: Фенибут.

Лекарственная форма: Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

Состав: 1 пакетик содержит:

Фенибут 100 мг;

Вспомогательные вещества: изомальт (E953), маннит (E421), калия ацесульфам, ароматизатор апельсиновый натуральный.

Описание: Порошок от белого до светло-кремового цвета, допускаются вкрапления желтого цвета.

Код АТХ: N06BX22.

Фармако-терапевтическая группа: Другие психостимуляторы и ноотропные средства.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Доминирующим действием препарата является антигипоксическое и антиамнестическое действие. **Норма Кидс** стимулирует процессы обучения, улучшает память, повышает физическую и умственную работоспособность. Также **Норма Кидс** имеет свойства транквилизатора: устраняет психоэмоциональное напряжение, тревожность, страх, эмоциональную лабильность, раздражительность, улучшает сон, удлиняет и усиливает действие снотворных, наркотических, нейролептических и противосудорожных средств. Психологические показатели (внимание, память, скорость и точность сенсорно-моторных реакций) под влиянием **Норма Кидс** улучшаются в отличие от действия транквилизаторов. Препарат удлиняет латентный период и сокращает продолжительность и выраженность нистагма, оказывает антиэпилептическое действие. Не влияет на холино- и адренорецепторы. **Норма Кидс** заметно уменьшает проявления астении и вазовегетативных симптомов, включая головную боль, ощущение тяжести в голове. У больных с астенией и у эмоционально лабильных лиц уже с первых дней терапии с помощью **Норма Кидс** улучшается самочувствие, повышается интерес и инициатива, мотивация деятельности без нежелательной седации или возбуждения. Установлено, что **Норма Кидс** улучшает биоэнергетику мозга.

Фармакокинетика:

Препарат хорошо всасывается после перорального приема и хорошо проникает во все ткани организма, хорошо проходит через гематоэнцефалический барьер. Распределение в печени и почках близко к равномерному, а в мозге и крови – ниже равномерного. За 3 часа заметное количество препарата обнаруживают в моче, в то же время концентрация препарата в ткани мозга не уменьшается, его обнаруживают в мозге еще через 6 часов. На следующий день препарат можно выявить только в моче; его находят в моче еще через 2 дня после употребления, но обнаруженное количество составляет только 5% от введенной дозы. Наибольшее связывание происходит в печени (80 %), оно не является специфическим. При повторном введении кумуляции не наблюдается.

Показания для применения:

- нарушение памяти, снижение концентрации внимания;
- бессонница;
- астенические и тревожно-невротические состояния: беспокойство, страх, тревога;
- невроз навязчивых состояний, психопатия;
- лечение заикания, энуреза, тиков;
- гиперактивность в детском возрасте;
- профилактика укачивания при кинетозах;
- профилактика стрессовых состояний, перед операциями или болезненными диагностическими исследованиями;
- болезнь Меньера, головокружения, связанные с дисфункцией вестибулярного аппарата различного генеза.

Способ применения и дозы: Содержимое пакетика растворяют в половине стакана теплой воды и принимают внутрь до еды. Курс лечения составляет 2-6 недель.

Детям от 3-х до 4-х лет по 100 мг 2 раза в день;

Детям от 5 до 6 лет по 100 мг 2-3 раза в день,

Детям от 6 до 10 лет по 100 мг 3-4 раза в день;

Детям от 10 до 14 лет по 200 мг 2-3 раза в день.

Для профилактики укачивания принимать 100 мг препарата за час до путешествия морским, наземным или воздушным транспортом. Если пропущен прием, примите препарат, как только вспомните об этом, но пропустите, если уже почти наступило время следующего приема.

Высшие разовые дозы для детей: до 6 лет – 100 мг, с 7 до 10 лет – 200 мг, с 11 до 14 лет - 300 мг.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к действующему веществу или вспомогательным веществам препарата;
- острая почечная недостаточность;
- детский возраст до 3 лет.

Лекарственные взаимодействия: Удлиняет и усиливает действия снотворных, наркотических анальгетиков, противоэпилептических и противопаркинсонических средств, транквилизаторов и нейролептиков.

Особые указания: Следует соблюдать осторожность больным с эрозивно-язвенными заболеваниями ЖКТ из-за раздражающего действия препарата. Этим больным назначаются меньшие дозы препарата. При длительном применении необходимо контролировать показатели функции печени и картину периферической крови.

Передозировка:

Норма Кидс – малотоксичный препарат, лишь в суточной дозе 7-14 г при длительном применении он может быть гепатотоксичным.

Указанные дозы значительно превышают средние терапевтические дозы, согласно возраста ребенка. Только при высшей дозе, наблюдались эозинофилия и жировая дистрофия печени. Если препарат применяли в меньших дозах, таких изменений не отмечалось.

Симптомы: сонливость, тошнота, рвота, возможное развитие артериальной гипотензии, острая почечная недостаточность.

Лечение: промывание желудка терапия симптоматическая.

В случае осложнений (артериальная гипотензия, почечная недостаточность) принимают вспомогательные и симптоматические меры.

Побочные эффекты:

После первого применения препарата возможны сонливость, тошнота, головокружение, головная боль.

Редко – аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд.

Условия хранения: Срок годности 2 года.

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска: По 100 мг препарата в пакетике из ламината. По 10 пакетиков в картонной пачке.

Условия отпуска: По рецепту.

Произведено для:

MAXX-PHARM LTD.

Лондон, Великобритания

